

Opciones Para Un Aborto Durante el Primer Trimestre de Embarazo

	Pastillas Abortivas: Mifepristona y Misoprostol	Procedimiento de Aborto
¿A cuantas semanas de embarazo puedo estar?	Hasta 11 semanas desde el primer día de su último período.	Hasta 12 semanas desde el primer día de su último período.
¿Que pasará?	El aborto ocurre en su casa. Tome la primera pastilla (mifepristona) a una hora conveniente. Es probable que no sentira nada después de tomar la mifepristona. Puede ser que tenga un poco de náusea. Después, coloque las 4 pastillas de misoprostol. Los cólicos y el sangrado comenzarán pocas horas después de tomar el misoprostol. Tendrá sangrado abundante y cólicos. No necesita una visita de seguimiento de rutina. Puede hacer una visita o llamada de seguimiento 7-14 días después.	El aborto ocurre en el centro de salud. El procedimiento en sí dura de 5-10 minutos. Su proveedor de salud utiliza instrumentos que se introducen en la vagina y el útero para extraer el embarazo. No necesita una visita de seguimiento de rutina. Puede hacer una visita de seguimiento 1-2 semanas después del procedimiento.
¿Qué tan doloroso es?	Es posible que tenga cólicos leves a muy fuertes de vez en cuando durante el aborto. Pastillas para el dolor ayudan.	Es posible que tenga cólicos leves a muy fuertes durante el aborto. Pastillas para el dolor ayudan.
¿Cuanto voy a sangrar?	Es común que durante el aborto haya sangrado abundante e incluso coágulos. Después, sangrado más ligero puede continuar de manera intermitente por unas semanas.	Puede tener un sangrado leve durante 1-7 días. El sangrado puede continuar de manera intermitente por unas semanas.
¿Cuánto cuesta?	Para los dos tipos de aborto, el costo exacto depende de donde vaya.	
¿Podría fallar el aborto?	Las pastillas tienen una tasa de éxito de 98-99%. Si las pastillas no interrumpen el embarazo, puede intentar las pastillas de misoprostol otra vez o tener un procedimiento de aborto.	El procedimiento tiene una tasa de éxito mas del 99%. Si no se interrumpa el embarazo por completo, tendrá que repetirlo.

Opciones Para Un Aborto Durante el Primer Trimestre de Embarazo

	Pastillas Abortivas: Mifepristona y Misoprostol	Procedimiento de Aborto
¿Podré tener hijos después?	Sí. Ningunos de los tipos de aborto afectan la posibilidad de embarazarse o quedarse embarazada en el futuro.	
¿Qué tan seguro es?	Los dos medicamentos son seguros. Las complicaciones son raras.	El procedimiento de aborto es seguro. Los abortos durante las primeras 12 semanas presentan muy pocos problemas.
Cosas que saber	Toma 1-2 días para completar el aborto. El sangrado puede ser muy abundante y durar por más tiempo que un procedimiento de aborto por aspiración. No necesita inyecciones, anestesia, ni se le introducen instrumentos en su cuerpo. Hacerlo en la casa y no en un centro de salud puede ser más cómodo y privado. Puede tener cualquier persona de apoyo presente, o puede estar solo. No se puede usar en caso de un embarazo más avanzado. Los cólicos pueden ser dolorosos y pueden durar por más tiempo que un procedimiento de aborto. Puede parecer más natural, como un aborto espontáneo. No puede interrumpir un embarazo ectópico.	Toma pocos minutos para completar el aborto. Ve menos sangrado que un aborto con pastillas. Un proveedor de salud tiene que insertar instrumentos en el útero. Hay personal médico presente. Tiene menos control sobre el proceso y de quién le puede acompañar. Puede hacerlo con un embarazo más avanzado que un aborto con pastillas. La anestesia y los analgésicos pueden causar efectos secundarios. La máquina de succión puede ser ruidosa. No puede interrumpir un embarazo ectópico.

Dónde encontrar cuidado de aborto: www.abortionfinder.org, www.ineedana.com